

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/09/0002**

**Drontal Plus Flavour 35 kg tabletes suņiem**

**1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Bayer Animal Health GmbH  
Leverkusen 51368  
Vācija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorefer Straße 324, 24106 Kiel, Vācija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Drontal Plus Flavour 35 kg tabletes suņiem**

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viena tablete satur:

**Aktīvās vielas:**

Febantels	525 mg
Pirantela embonāts	504 mg
Prazikvantels	175 mg

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Suņiem jauktu sekojošu apaļtārpu un lenteņu invāziju ārstēšanai.

Cērmes           - *Toxocara canis*  
                      - *Toxoscaris leonina*

Āķtārpi           - *Uncinaria stenocephala*  
                      - *Ancylostoma caninum*

Matgalvji       - *Trichuris vulpis*

Lenteņi           - *Echinococcus granulosus*  
                      - *Echinococcus multilocularis*  
                      - *Dipylidium caninum*  
                      - *Taenia* spp.  
                      - *Multiceps multiceps*  
                      - *Mesocestoides* spp.

Invāzijas ārstēšanai, ko ierosina protozojs *Giardia* spp. suņiem.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Jāievēro īpaša piesardzība, lietojot pirantelu saturošas zāles kahektiskiem dzīvniekiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

## 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamā deva ir 15 mg febantela, 14,4 mg pirantela embonāta un 5 mg prazikvantela uz 1 kg ķermeņa svara, kas atbilst 1 Drontal Plus Flavour 35 kg tabletei uz 35 kg ķermeņa svara. Drontal Plus Flavour ir pieejams suņiem ar mazāku ķermeņa svaru.

Dažkārt smagas invāzijas gadījumā cērmju iznīcināšana var būt nepilnīga, īpaši kucēniem. Cilvēku invadēšanās, kuri bijuši kontaktā ar invadētiem dzīvniekiem, var būt aktuāla arī pēc ārstēšanas. Tādēļ ir jāseko līdzi un jāveic atkārtota ārstēšana atbilstošā laikā (kucēniem 6 un 12 nedēļu vecumā).

Suņiem *	
Ķermeņa svars (Kg)	Tablešu skaits
≤ 20	jālieto atbilstoša tablete mazākiem suņiem
20 - ≤ 35	1
35 - ≤ 50	1 1/2
55 - ≤ 70	2

\* Nelietot suņiem ar ķermeņa svaru līdz 20 kg

Ārstēšanas ilgums:

Apaļtārpu un lenteņu invāzija:

Regulāra attārpošana pieaugušiem suņiem jāveic ik pēc 3 mēnešiem. Ieteicama vienas devas ārstēšana.

*Giardia* spp. invāzija:

Ārstēt 3 dienas pēc kārtas.

Ārstēšanu uzsākt no 3 nedēļu vecuma, kas ir pats agrākais laiks, kad suņiem var diagnosticēt jauktu lenteņu invāziju, tādēļ ārstēšanu ar Drontal Plus Flavour 35 kg nevajadzētu uzsākt kucēniem, kas jaunāki par 3 nedēļām.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tabletes var dot tieši mutē, bet, ja nepieciešams, tās var piejaukt nelielam barības daudzumam.

Nav nepieciešamas īpašas izmaiņas ēdināšanā.

Attārpošanas gadījumā vienreizēja lietošana.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Blusas ir starpsaimnieki plaši izplatītajam lenteņu tipam – *Dipylidium caninum*. Lenteņu invāzija noteikti atkārtosies, ja vien netiks veikta to starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu u.c. apkarošana.

Jācenšas izvairīties no turpmāk minētajām darbībām, jo tās palielina rezistences veidošanās risku un var būt par iemeslu terapijas neefektivitātei:

- pārāk bieža un atkārtota vienas grupas antihelmintisku līdzekļu ilgstoša lietošana;
- pārāk mazas devas lietošana, kas iespējama nepietiekami noteikta ķermeņa svara vai zāļu nepareizas lietošanas dēļ.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Suņiem ar ķermeņa svaru līdz 20 kg jālieto atbilstoša tablete mazākiem suņiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Zāles jālieto piesardzīgi. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām, ar pastiprinātu jutību pret prazikvantelu, pirantela pamoātu vai fenbendazolu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Lai ievērotu higiēnas prasības, personām, kuras dod tableti sunim tieši mutē vai pievieno to suņa barībai, jāmazgā rokas pēc lietošanas.

*Giardia* spp. invāzijas gadījumā rūpīgi iztīrīt un dezinficēt mītni vai pārvietot suņus, kamēr veic apstrādi, īpaši suņu audzētavās.

*Giardia* spp. var invadēt cilvēkus, tāpēc meklējiet medicīnisko palīdzību gadījumā, ja jūsu suns ir invadēts.

Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums pirmajā un otrajā grūsnības trimestrī. Nelietot kucēm pirmajā un otrajā grūsnības trimestrī.

Vienreizēja ārstēšana pēdējā grūsnības trimestrī vai laktācijas laikā ir pierādīta kā droša.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar holīnerģiskām zālēm (piem., levamizolu). Vielu darbība, kurām piemīt acetilholīnesterāzes iedarbība (piem., organofosfātu savienojumi) var ievērojami palielināties, ja tiek lietotas kopā ar šīm zālēm.

Specifiska piperazīna iedarbība (parazītu neiromuskulāra paralīze) var kavēt pirantela efektivitāti (parazītu spastiskā paralīze).

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna sāļiem, jo var būt antagonisks efekts starp pirantelu un piperazīnu. Tāpat nelietot vienlaicīgi ar insekticīdiem, kuri satur fosfororganiskos savienojumus un dietilkarbamazīnu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Desmitkārtīgi palielinot ieteicamo devu, netika novērotas intoleroances pazīmes.  
Ārstējot grūsnas kuces, nedrīkst pārsniegt noteikto devu.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

03/2018

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.  
Lietošanai dzīvniekiem.

PVC/alumīnija blisteros pa 2 vai 10 tabletēm.  
Kartona kastītē 1, 2, 5 un 10 blisteri.  
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.