

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/99/0982

**Bolfo 1,23 g kakla siksna kaķiem un maza auguma suņiem**

### **1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Bayer Animal Health GmbH  
51368 Leverkusen,  
Vācija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel,  
Vācija

### **2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Bolfo 1,23 g kakla siksna kaķiem un maza auguma suņiem**  
*Propoksūrs*

### **3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viena 12,5 g kakla siksna satur:

**Aktīvā viela:**

Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) 1,23 g

### **4. INDIKĀCIJAS**

Blusu (*Ctenocephalides* spp.) un ērču (*Ixodes ricinus*) invāzijas kontrolei kaķiem un maza auguma suņiem.

Ārstnieciskā kakla siksna nepārtraukti izdala aktīvo vielu. Blusas tiek nogalinātas dažu stundu laikā no siksnes uzlikšanas brīža. Piestiprinājušās ērces tiek nogalinātas aptuveni vienas dienas laikā. Tās ir viegli noņemt, vai arī ērces pēkšni nokrīt pašas.

Retos gadījumos ērču piestiprināšanās var notikt kakla siksnes lietošanas laikā, bet tad tās tikai pieķeras ādai un atkrīt nost, parasti bez asiņu sūkšanas.

Aizsardzības ilgums pret blusām: līdz 4 mēnešiem.

Aizsardzības ilgums pret ērcēm: līdz 10 nedēļām.

### **5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot slimiem dzīvniekiem (jo īpaši, ja ir mehāniski gremošanas orgānu vai urīnizvadorgānu nosprostojumi, bronhiālā astma vai citas plaušu un asinsrites sistēmas slimības) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot šīs veterinārās zāles arī:

- laktējošām kucēm un kaķenēm,
- dzīvniekiem grūsnības beigu posmā,
- kucēniem un kaķēniem, kuri jaunāki par 3 mēnešiem,
- dzīvniekiem, kuriem ir plaši ādas iekaisumi,
- dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.

## **6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Ļoti jutīgiem dzīvniekiem var būt ādas kairinājums un nieze, jo īpaši pirmajās dienās pēc kakla siksna uzlikšanas. Ja parādās šādi simptomi, kakla siksna jānoņem, līdz simptomi izzūd. Nav nepieciešama specifiska ārstēšana.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Kaķi un maza auguma sunji.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Kakla siksna lietošanai ap kaklu.

Viena kakla siksna katram dzīvniekam.

Izņemiet kakla siksnu no hermetizētā iepakojuma, atritiniet un nopņemiet plastikāta loksnītes no siksna iekšpuses. Aplieciet siksnu brīvi ap dzīvnieka kaklu un nogrieziet pāri palikušo lieko siksna galu. Siksnu nedrīkst savīlkt pārāk cieši (ieteicams, lai starp siksnu un kaklu var palikt divus pirkstus). Pirmajās dienās pēc siksna uzlikšanas pārbaudiet dzīvnieka ādu kakla apvidū, jo dažiem dzīvniekiem siksna nospiedums var izraisīt kairinājumu. Regulāri pārbaudiet kakla siksna ciešumu.

Kakla siksna efektivitātes ilgumu nosaka dzīvnieka apmatojuma garums un stāvoklis, dzīvnieka aktivitātes pakāpe un parazītu invāzija. Lai nodrošinātu pilhvērtīgu kakla siksna efektivitāti, dzīvniekus ar raupju, savēlušos vai netīru apmatojumu vajadzētu nomazgāt ar šampūnu pirms kakla siksna uzlikšanas. Ja kakla siksna efektivitāte izbeigusies, tā jānomaina.

Dzīvnieka aprūpe var tikt turpināta kā parasti. Noņemiet kakla siksnu pirms dzīvnieka mazgāšanas un atkal aplieciet ap kaklu, kad apmatojums ir sauss. Bieža saskare ar ūdeni (lietus, peldēšanās, mazgāšana) var mazināt kakla siksna efektivitāti.

Blusu invāzijas gadījumā visi mājsaimniecībā esošie dzīvnieki jāapstrādā ar piemērotu, reģistrētu insekticīdu.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Papildus blusām, kuras invadējušas sunus un kaķus, arī apkārtne var būt aptraipīta ar blusu oliņām, kāpuriem un kūniņām, kas var attīstīties par jaunām blusām. Lai pastiprinātu ārstēšanas efektivitāti, ieteicams mājdzīvnieku guļvietas, to tuvāko apkārtni un dzīvnieku iecienītās atpūtas vietas apstrādāt ar piemērotu insekticīdu vai insektu augšanas inhibitoru.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  
Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc “Derīgs līdz”.  
Derīguma termiņš attiecīnāms uz mēneša pēdējo dienu.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem jāizvairās no kontakta ar dzīvniekiem, kas valkā kakla siksnu.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Neļaut rotājties ar kakla siksnu, sevišķi bērniem.

Neļaut sūkāt un košķāt kakla siksnu, sevišķi bērniem.

Izvairīties no kontakta ar acīm un ādu.

Nedzert, neēst vai nesmēkēt rīkojoties ar kakla siksnu.

Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, lūdzu, meklējiet medicīnisko palīdzību.

### Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Kakla siksna paredzēta ārīgai lietošanai kā insekticīds.

### Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no tiešas saskares ar acīm un ādu. Siksnes uzlikšanas laikā lietot cimdus. Lietošanas laikā izvairīties no pārmērīgas saskares ar kakla siksnu, un pēc pieskaršanās tai, rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu, propoksūru, vai kādu no palīgyielām, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Nejaušas šīs kakla siksnes saskares gadījumā ar ādu, nekavējoties skalot skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens.

Ar *Bolfo* kakla siksnu nedrīkst darboties sievietes grūtniecības trešajā trimestrī.

Dzīvnieki, kuri valkā *Bolfo* kakla siksnu, nedrīkst atrasties kopā ar maziem bērniem un zīdaiņiem.

Šīs zāles ir ļoti toksiskas ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm. Šīs zāles var izraisīt ilgstošu nevēlamu iedarbību uz ūdens vidi.

Neļaut suņiem, kas valkā šo kakla siksnu peldēties ūdenstilpnēs, jo tas var apdraudēt ūdenī dzīvojošus organismus.

Nelietot iepakojumu atkārtoti. Iznīcināt tukšo iepakojumu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Aktīvā viela propoksūrs ir toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem. Nepiesārņot ar veterinārajām zālēm vai to atkritumiem upes, ūdenstilpnes, ūdensteces, dambjus un citus ūdens avotus. Jautājiet savam veterinārārīstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

12/2015

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.